stomdevice

Zhermack

zeta 3 foam

specific for **surfaces**

ready to use | alcohol free

- Bactericidal
- Yeasticidal
- Tuberculocidal
- Virucidal



last Update: 2022-09

U1168059-2022-09

3 L | disinfectant for medical devices | www.zhermack.com

Reorder N. REF C810026

LOT

27°C 80°F max

0123

Zhermack S.p.A. | via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597 611 | www.zhermack.com

ZHERMACK S.p.A. Via Bovazecchino, 100, 45021 Badia Polesine (Ro), Italy
ЖЕРМАК С.п.А. Via Bovazecchino, 100, 45021, Бадія Полезіне (Ро), Італія

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна
Тел.: 0 800 21-52-32
Електронна пошта: uarep@cratia.ua

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:
30 вересня 2022 року

UA.TR.116

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России

stomdevice

Zeta 3 Foam

RANGE OF ACTION

Efficacy (microorganisms)	Reference standard *Tests carried out in dirty conditions.*	Reaction Time (minutes)
Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 13697, EN 16615*, EN 14561	5
Yeasticidal (C. albicans)	EN 13624, EN 13697, EN 16615, EN 14562	5
Tuberculocidal (M. terrae)	EN 14348, EN 14563	5
Virucidal (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, including HIV, HBV, HCV)	EN 14476	1

* E. coli included.

EN - Alcohol-free foam spray disinfectant and cleaner for delicate invasive and not invasive medical device surfaces. Zeta 3 Foam is an aldehyde-free, ready-to-use broad range biocidal disinfectant and cleaner. Its excellent compatibility with materials makes Zeta 3 Foam particularly suitable for the disinfection between patients of delicate medical device surfaces (handpieces, contra-angles, dental units, etc.).

Composition:
100 g of Zeta 3 Foam contains 0.315 g dimethyl-didecyl-ammonium chloride, 0.075 g alkylbenzyl-dimethyl ammonium chloride, non-ionic surfactants, additives,
auxiliaries and water to 100 g.

Range of action:
Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), Yeasticidal (C. albicans), Tuberculocidal (M. terrae) in 5 minutes and Virucidal (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, including HIV, HBV, HCV) in 1 minute. The activities are tested in accordance with EN 13624, EN13697, EN13727, EN16615, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563. Virucidal activity is tested in accordance with EN14476. For further details on reaction time and effecacy, please refer to the table.

Use:
Spray Zeta 3 Foam over the area until the surfaces and areas to be disinfected are sufficiently covered (4 sprays of Zeta 3 Foam allow to cover a surface of 0,25 m2). Leave it to work, then remove the disinfecting emulsion with a tissue and finally leave to dry. Alternatively, it is possible to spray Zeta 3 Foam on a tissue and wipe it over surfaces and areas to be disinfected. It is recommended to follow the times indicated in the table. Exposures for longer times could lead to a long-term deterioration of the treated surfaces.

Warnings, precautions and conservation conditions
This product has been designed for use by qualified operators with knowledge of the required safety standards. Use protective gloves and appropriate PPE. Operate in well-ventilated areas. Store the closed container in a cool dry place. Avoid contact with aluminium, brass and unalloyed iron surfaces. Prevent Zeta 3 Foam from coming in contact with other disinfectants or cleaners, particularly with anionic or aldehyde surfactants (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc). Any slight difference in the perfume is due to the presence of natural fragrance and does not jeopardise quality of the product. Once the container has been opened and the applicator inserted, keep in a vertical position.

RU - Не содержащая спирта пена для дезинфекции и мойки чувствительных инвазивных и неинвазивных поверхностей медицинского оборудования.

Zeta 3 Foam - готовое к применению безальдегидное дезинфицирующее и моющее средство с широким спектром биоцидного воздействия. Благодаря совместимости с материалами Zeta 3 Foam особенно рекомендуется для дезинфекции деликатных поверхностей медицинского инструмента (ручек, плевательниц, установок и т.п.) в перерывах между пациентами.

СОСТАВ
100 г Zeta 3 Foam содержат 0,315 г диметил-дидецил хлорида аммония, 0,075 г алкил-бензил-диметил хлорида аммония, неионные поверхностно-активные средства, добавки, вспомогательные вещества, остальное вода.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ:
Бактерицидная (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae), дрожжевая (C. albicans), туберкулоцидная (M. terrae) за 5 минут и вирусоцидная (полиовирус, аденовирус, норовирус, парвовирус, включая ВИЧ, HBV, HCV) за 1 минуту. Активность тестируется в соответствии с EN 13624, EN13697, EN13727, EN16615, EN14348, EN 14561, EN 14562, EN14563.
Вирусидная активность тестируется в соответствии с EN14476. Более подробная информация о времени реакции и эффективности приведена в таблице.

ПРИМЕНЕНИЕ
Разбрызгайте Zeta 3 Foam и равномерно распределите по всем
дезинфицируемым поверхностям и объектам (4 распыления Zeta 3 Foam позволяют покрыть поверхность площадью 0,25 м2).
Дайте веществу воздействовать, после чего сотрите дезинфицирующую эмульсию салфеткой и оставить поверхность высыхать. В качестве альтернативы можно впрыснуть Zeta 3 Foam на салфетку и протереть ею дезинфицируемые поверхности и объекты. Рекомендуется соблюдать время, указанное в таблице. Более длительное воздействие может привести к долговременному ухудшению состояния обработанных поверхностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Продукт предназначен для использования квалифицированным персоналом, ознакомленным с необходимыми мерами безопасности. Используйте защитные перчатки и соответствующие СИЗ. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Храните продукт тщательно закрытым, на свежем воздухе в сухом месте. Избегайте контакта с поверхностями из алюминия, латуни и нелегированного железа. Избегайте контакта Zeta 3 Foam с другими дезинфекционными или моющими средствами, особенно с продуктами, содержащими неионные поверхностно-активные вещества или альдегиды (формальдегид, глутаральдегид, глиоксаль, и т.п.). Возможное легкое изменение аромата со временем вызвано наличием в составе натуральных ароматизаторов и никак не влияет на качество продукта. После того, как контейнер открыт и установлен аппликатор, удерживайте в вертикальном положении.

stomdevice.com